


Les dents de sagesse

Les dents de sagesse, appelées également troisièmes molaires, sont normalement au nombre de 4. Il est possible d'en avoir moins ou pas du tout. Elles apparaissent généralement à 18 ans, et peuvent être extraites si elles viennent perturber la bouche.

Quand faut-il les extraire ?

- Les dents de sagesse peuvent pousser normalement, mais elles risquent aussi d'avoir des accidents d'évolution lors de leurs poussées, de s'infecter ou de provoquer des dégâts sur d'autres dents. Ces accidents d'évolutions concernent surtout les dents de sagesse inférieures.
- Lorsqu'une dent de sagesse manque de place, il est parfois préférable de l'extraire afin d'éviter de nombreux désagréments. Par exemple, quand elle pousse partiellement ou de travers et entraîne des douleurs importantes, ou quand elle rompt l'alignement des dents adjacentes pour trouver sa place...
- En outre, les caries sur les dents de sagesse sont plus fréquentes car elles sont difficiles à atteindre avec la brosse à dents.



— “Lorsqu'une dent de sagesse manque de place, il est préférable de l'extraire.”

› L'INTERVENTION

- Selon la disposition et le nombre de dents à extraire, l'extraction des dents de sagesse se fera en une ou deux fois. L'intervention étant relativement simple et courante, l'anesthésie locale est la solution la plus indiquée.
- L'anesthésie générale, impliquant une hospitalisation, sera surtout préconisée pour enlever les quatre dents de sagesse en une seule fois.

— “Si la dent de sagesse a trouvé sa place sur la mâchoire et qu'elle peut être correctement nettoyée, il n'y a pas lieu d'intervenir.”



Eruption de la dent de sagesse



Extraction de la dent de sagesse



Cicatrisation

› APRES L'EXTRACTION



Après l'extraction de vos dents de sagesse, il est courant de subir une certaine gêne au niveau de la bouche.

- Après l'extraction d'une ou de plusieurs dents de sagesse, il est fréquent qu'un petit saignement persiste pendant quelques heures. Il suffit alors d'appliquer une compresse stérile sur la zone de l'extraction et de la mordre jusqu'à ce que le saignement s'arrête.
- Un œdème (gonflement) peut aussi survenir à la suite de l'intervention : il est alors conseillé d'appliquer de la glace sur la joue du côté de l'extraction afin de le réduire. En cas de douleur post-opératoire, des antalgiques vous auront été prescrits par votre chirurgien-dentiste. Il est important de les prendre pour éviter que la douleur ne s'installe.

— **“Après l'extraction de vos dents de sagesse, il est nécessaire de suivre les recommandations de votre chirurgien-dentiste pour diminuer les risques de complications.”**

À savoir

Une surveillance de l'évolution des dents de sagesse est conseillée afin de s'assurer qu'elles n'occasionnent pas de troubles sur les dents voisines. Un contrôle régulier au Cabinet permettra d'évaluer votre situation.

Certaines précautions après l'intervention sont nécessaires pour obtenir une bonne cicatrisation de la plaie. Ainsi une alimentation molle, tiède ou froide, une bonne hygiène buccale, l'arrêt du tabac, de l'alcool et de tous les irritants sont vivement recommandés.