

## Instructions de port des Elastiques inter-maxillaires



Nous avons ajouté des élastiques à votre appareil. Ils sont destinés à corriger les décalages entre les dents des deux arcades. Cette étape est très importante : sans elle le traitement ne pourra pas se terminer.

### Placement et retrait des élastiques :

Nous vous en avons remis une réserve qui doit suffire jusqu'au prochain rendez-vous.

- repérer les crochets situés sur les bagues et les arcs et suivre les instructions que nous vous avons indiquées.
- Le schéma suivant vous les rappelle :

Type d'élastiques :

Schéma de port :

Droit

Gauche

### Durée de port des élastiques :

- Jour et nuit.
- Les retirer pendant les repas et le brossage dentaire et les remettre immédiatement après.
- Les changer une seule fois par jour.
- En cas de perte du paquet ou s'il en manque, il faut nous en redemander immédiatement. Ces élastiques ne se vendent pas en pharmacie.

### Précautions :

- Utiliser le crochet fourni pour manipuler les élastiques plus facilement.
- Si un élastique casse, le remplacer immédiatement.
- Porter les élastiques régulièrement. Une journée sans élastique fait perdre une semaine de traitement.
- En cas d'intolérance ou d'allergie au latex connue ou révélée (irritations ou gonflement des joues, de la langue ou des lèvres), nous vous commanderons des élastiques sans latex.

**Docteur AOUIZERATE Patrick**

Docteur en Chirurgie Dentaire

Diplôme Universitaire d'Occlusodontologie

25 A, Avenue Pasteur – 13007 MARSEILLE - Tél : 04.91.52.67.15